

(50) ハスカップ

(ア) 病害

病害虫名及び 防除時期	防除方法及び注意事項
灰色かび病	薬剤防除 1. 樹冠散布

(イ) 害虫

病害虫名及び 防除時期	防除方法及び注意事項
アブラムシ類 (ニンジンアブ ラムシ) 4月下旬～5 月上旬 6月上～中旬	薬剤防除 1. 樹冠散布 (1) 散布は、晴天無風の早朝か夕方に樹全体につつむよう、できるだけいねいにする。 (2) 防除時期は4月下旬～5月上旬（発芽期～開花前）、6月上～中旬（落花期～着色始）。 (3) 訪花昆虫保護のため、開花時の薬剤散布は避ける。
ハマキムシ類 4月下旬～5 月上旬 6月上～中旬	薬剤防除 1. 樹冠散布 (1) 散布は、晴天無風の早朝か夕方に樹全体につつむよう、できるだけいねいにする。 (2) 防除時期は4月下旬～5月上旬（発芽期～開花前）、6月上～中旬（落花期～着色始）。 (3) 訪花昆虫保護のため、開花時の薬剤散布は避ける。
カタカイガラ ムシ 休眠期	耕種的防除 1. 休眠期（11～4月上旬）に、寄生が多い枝は切り取り、適正に処分するなど密度低下を図る。

(ウ) クリーン農業技術（病害虫防除関係分）（ハスカップ）

- 発生モニタリングによる効率的防除
 - ・ほ場観察による発生モニタリングで適期防除
- 化学的防除の効率化
 - ・休眠期の機械油乳剤散布によるカイガラムシ類の越冬雌成虫の削減
- 耕種的防除
 - ・被害果、被害葉の摘み取り搬出
 - ・カイガラムシ発生ほ場では、休眠期にブラシ等で除去
 - ・ハダニ対策として株もとの除草による発生源の除去

※栽培に当たっての留意事項

- 適正樹勢・受光環境の改善で健全な樹体づくりを行うこと。